



J.A.D.M. Maessen, tandarts
Suikerdoossingel 34
6051 HP Maasbracht
0475 461670
info@tandartsmaessen.nl

Instructie na het trekken van een tand of kies voor patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken

Als u geneesmiddelen gebruikt, hoeft u daar niets aan te veranderen. Als u bij de trombosedienst onder controle staat, is van te voren met u besproken of u tijdelijk minder medicijnen moet innemen. Houdt u aan de voorschriften van de trombosedienst.

U mag gedurende 24 uur niet te spoelen. Als u antistollingsmiddelen (acenocoumarol of fenprocoumon (Marcoumar®), dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®) of apixaban (Eliquis®) slikt, krijgt u een recept voor een mondspoelmiddel met tranexaminezuur. Hiermee moet u ongeveer twee uur na de behandeling beginnen. U dient het middel 1-2 minuten in de mond te houden, zodat de vloeistof in contact komt met de wond. Als u dit lastig vindt, mag u ook een gaasje drinken in de tranexaminezuur vloeistof en dit tegen de wond aan houden gedurende 1-2 minuten. Dit moet u vier keer per dag doen.

De wondgenezing wordt belemmerd door roken en alcoholgebruik, dit wordt zeer afgeraden de eerste vijf dagen na de ingreep.

Goede mondhygiëne is belangrijk. Wees behoedzaam in de buurt van de wond en probeer zo voorzichtig mogelijk te spoelen.

Meteen na de ingreep krijgt u een gaasje op de wond waarop u een half uur moet dichtbijten. Mocht er nog een kleine hoeveelheid bloed sijpelen, kunt u een nieuw steriel gaasje of een schone zakdoek opvouwen en hierop nogmaals een half uur dichtbijten. Het speeksel kan de komende dagen roze kleuren. Wanneer er sprake is van bloeden uit de wond, kunt u opnieuw gedurende 30 minuten dichtbijten op een gaasje. Bloedt de wond daarna nog steeds, neem dan contact op met uw tandarts voor overleg.

Als de wond gehecht is: de hechtingen lossen vanzelf op na ongeveer twee weken.

De verdoving is na twee à drie uur uitgewerkt. Tot die tijd niet eten of drinken om te voorkomen dat u per ongeluk op de verdoofde wang, tong of lip bijt.

Eten en drinken nadat de verdoving is uitgewerkt mag, maar laat het een beetje afkoelen, en vermijd het gebied van de wond.

Wees voorzichtig met extreme zonnewarmte.

Bij napijn mag u paracetamol gebruiken volgens de aanwijzingen op de verpakking. Leest u ook de bijsluiter. Andere pijnstillers, zoals ibuprofen, kunnen als bijwerking hebben dat de wond wat langer nabloedt. Deze medicijnen kunt u beter niet gebruiken als u bloedverduunners slikt.

Wanneer bellen?

- Bij koorts boven de 39°C.
- Als na vier dagen de zwelling van de wang of de pijn niet afneemt, of juist toeneemt.
- Als de wond ondanks uw voorzorgen blijft bloeden.
- Natuurlijk kunt u ook altijd bellen wanneer u vragen heeft of zich ongerust maakt